

FLORAÇÃO DE VERÃO

LISTA PHENOLOGICA DAS OBSERVAÇÕES EFFECTUADAS NO JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO

- Ambelania grandiflora* Hub. — Apocynacea. Nome vulgar: "Assucar d'agua". Flores alvas. Brasil.
- Apeiba tibourbou* Aubl. — Tiliacea. Nome vulgar: "Pau de jangada". Arvore. Flores amarellas. Guyanas e Venezuela.
- Arachis glabrata* Benth. — Leg. Pap. Herbacea. Flora amarellas. Brasil.
- Baccharis mucronata* H. B. K. — Composta — Nome vulgar: "Alecrim do matto". Flores alvas. Mexico.
- Brunfelsia Hopeana* Benth. — Solanacea. Nome vulgar: "Manacá". Arbusto. Flores roxas, odorantes. Brasil.
- Byrsonima sericea* DC. — Malpighiaceae. Nome vulgar: "Muricy". Brasil.
- Calliandra brevipes* Benth. — Leguminosa (Mimos.). Floração intensa rosea, branca e rosea, de bello effeito. Ornamental. Planta brasileira. Florece varias vezes por anno.
- Cassia fistula*. Linn. — Leguminosa (Caesalp.). Nomes vulgares: "Cana-fistula", "Cassia imperial", "Chuva de ouro". Arvore. Flores amarello-ouro em cachos pendentes. Originaria da Asia tropical.
- Caesalpinia pyramidalis* Tul. — Leguminosa (Caesalp.). Flores amarellas. Brasil.
- Caesalpinia tinctoria* Domb. — Leguminosa (Caesalp.). Nome vulgar: "Tintureira". Arvore. Flores amarellas. Colombia.
- Celosia argentea* Linn. — Amarantacea. Flores branco-prateado. Tropicos.

- Cereus peruvianus* Mill. — Cactacea. Flores alvas. Brasil e Guianas.
- Chorisia crispiflora* H.B.K. — Bombacacea. Nome vulgar: "Paineira". Arvore. Flores roseas, grandes.
- Clerodendron fragrans* Willd. var. *flore-pleno* Hort. — Verbenacea. Arbusto. Flores de coloração branca, ligeiramente rosea. Originaria da China.
- Clerodendron infortunatum* Gaertn. — Verbenacea. Flores vermelhas. Indias.
- Clitoria amazonum* Mart. — Leguminosa (Papil.). Floração branco-rosado. Brasil.
- Clitoria racemosa* Benth. — Leguminosa (Papil.). Arvore. Flores roxo-claro. Brasil.
- Clitoria ternatea* L. var. *flore-pleno* — Leguminosa (Papil.). Escandente. Flores azues. Tropicis.
- Clusia fluminensis* Pl. et Tr. Guttifera. Nomes vulgares: "Mangue da praia", "Abano". Flores alvas. Brasil.
- Cordia taguahyensis* Vell. — Borriginacea. Arbusto. Flores alvas. Brasil.
- Couroupita guianensis* Aubl. — Lecythidacea. Nomes vulgares: "Castanha de macaco", "Abriçó de macaco". Arvore frondosa. Floração em ramos insertos no tronco, desde a base. Flores grandes, carnosas, roseas bonitas. Brasil e Guianas.
- Dahlstedtia pinnata* Malme. — Leguminosa (Pap.). Flores roseo-roxeadas. Brasil.
- Desmodium discolor* Vog. — Leguminosa (Pap.). Nome vulgar: "Marmelada de cavallo". Flores roxas. Brasil.
- Epidendrum difforme* Jacq. — Orchidacea. Flores amarello-limão, abundantes, pequenas. Brasil.
- Eryngium serra* Cham et Schlech. — Umbellifera: Brasil.
- Erythrina corallodendron* Linn. — Leguminosa (Pap.). Nomes vulgares: "Flor de coral", "mulungú", "Suinã". Flores vermelho alaranjadas. America boreal e Indias occidentaes.
- Eugenia caryophyllata* Thunb. — Myrtacea. "Craveiro da India". Arvore. Flores pequenas, brancas. India.
- Eugenia malaccensis* Lin. — Myrtacea. Arvore. Floração intensa, roxa. Fructo comestivel. Asia.
- Galphimia gracilis* Bartl. — Malpighiacea. Flores amarellas. Mexico.

- Garcinia Livingsstonei* T. Anders. — Guttifera. Arvore. Floração branco-amarellado, odorante. Africa tropical.
- Globba Schomburgkii* Hook.f. — Zingiberacea. Herbacea. Flores amarellas. Sião.
- Gomphrena officinalis* Mart. — Amarantacea. Herbacea. Flora cõr de abobora. Originaria do Brasil.
- Grewia paniculata* Roxb. — Tiliacea. Arvore. Cachos amarellas, abundantes. Originaria da Malaya.
- Hedychium coccineum* Buch. Ham. Zingiberacea. Flores vermelhas.
- Hedychium spicatum* Ham. — Zingiberacea. Flores alvas. India oriental.
- Hibiscus rosa-sinensis* L. var. *fulgens* — Hort. Malvacea. Flores vermelhas.
- Hibiscus rosa-sinensis* L. var. *zebrinus* — Hort. Malvacea Rosa.
- Honckenya ficifolia* Willd. — Tiliacea. Arbusto. Flores roxas. Africa.
- Ipomoea fistulosa* Mart. — Convolvulacea. Nome vulgar: "Algodão do pantano". Flores roxas. Brasil.
- Isotoma longiflora* Presl. — Campanulacea. Nomes vulgares: "Jua-ti", "Céga-olho", "Arrebenta cavallo", "Jasmim da Italia", Flores alvas. Indias occidentaes.
- Kerria japonica* DC. — Rosacea. Flores amarello-ouro. Japão.
- Kopsia fruticosa* A.DC. — Apocynacea. Flores roseas. Malaya.
- Lafoensia replicata* Pohl. var. *adenophylla* Koehne. — Lythracea. Flores alvas com calice roxo. Brasil.
- Lagerstroemia flos-reginae* Retz. — Lythracea. Arvore. Floração em grandes cachos roseo-violaceos, erectos. Asia tropical.
- Lagerstroemia indica* L. — Lythracea. Flores roxo-roseo. China.
- Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers. — Lythracea. Arvore. Flores roxas. Asia.
- Lecythis lanceolata* Poir. — Lecythidacea. Nomes vulgares: "Sapucaia branca", "Sapucaia mirim". Flores roseas roxeadas. Brasileira.
- Lippia lycioides* Steud. Verbenaceae. Nome vulgar: "cedron". Flores alvas, odorantes. Brasil.
- Macrolobium bifolium* Pers. — Leguminosa (Caesalp.). Arvore. Flores alvas. Brasil.
- Medinilla venosa* Blume. — Melastomatacea. Arvore. Flores em grandes cachos pendentes, com bracteas roseo-carregado. Muito bonita. Malaya.

- Mimosa pudica* L. — Leguminosa (Mim.). Nome vulgar: “sensitiva”; flores roxas. Brasil.
- Mimosa sepiaria* Benth. — Leg. (Mim.). Nome vulgar: “espinho de Maricá”. Arbusto. Flores alvas. Brasil.
- Monodora myristica* Dun. — Anonacea. Arvore. Flores abundantes, grandes, pendentes, de coloração amarella, pintalgadas de marron. Africa.
- Parkia pendula* Benth. — Leguminosa (Pap.). Nome vulgar: “Visgueiro”. Flores vermelhas em capitulos pendentes. Brasil.
- Pavonia spinifex* Cav. — Malvacea. Nome vulgar: “Arranca estrepe”. Flores amarellas. Brasil.
- Pentagonia spathicalix* Schum. — Rubiaceae. Flores amarellas. Brasil.
- Piptadenia colubrina* Benth. — Leguminosa (Mim.). Nome vulgar: “Angico”. Arvore. Flores alvas. Brasil.
- Polygonum Baldschuanicum* Regel. — Polygonacea. — Escandente. Flores alvas. Asia central.
- Pontederia cordata* Lin. — Pontederiaceae. Planta aquatica, herbacea. Flores roxas. America tropical.
- Ravenia spectabilis* Engl. — Rutacea. Arbusto. Flores roseas. Cuba e Brasil.
- Rheedia longifolia* Planch et Triana — Guttifera. Nome vulgar: “Bacupary”. Flores amarello-claro. Fructos comestiveis. Brasil.
- Sarcocephalus esculentus* Afzel. — Rubiaceae. Escandente. Flores alvas, odorantes.
- Schwannia elegans* Juss. — Malpighiaceae. Planta de curiosa floração, com quatro flores em cada haste, sendo duas roseas e duas brancas. Brasil e Paraguay.
- Solanum sisymbriifolium* Lam. — Solanacea. Flores violaceas. America boreal e Mexico.
- Tamarindus indica* L. — Leguminosa (Caes.). Nome vulgar: “Tamarindo”. Flores amarello-alaranjado. Africa.
- Tecomaria capensis* Spach. — Bignoniaceae. Flores de côr “fraise”, avermelhada. Africa do Sul.
- Tibouchina granulosa* Cogn. — Melastomatacea. Nomes vulgares: “Flor de quaresma”, “Quaresma”. Flores roxas.
- Turnera aurantiaca* Benth. — Turneracea. Arbusto. Flor côr de laranja. Brasil e Guyanas.

Vangueria edulis Vahl. — Rubiaceae. Flores alvas. Africa tropical.

Victoria regia Lindl. — Nymphaeaceae. Nomes vulgares: "Forno de jaçanã", "Forno d'agua", "Mururé", "Victoria regia". Flores alvas. Brasil.

Watsonia Meriana Mill. — Iridaceae. Herbacea. Flores côr de abobora. Africa do Sul.

Zephyranthes candida Herb. — Amaryllidaceae. Flores alvas. Argentina.

L. A. P.

